

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA

LYMSKÁ BORELIÓZA

Virový	PŮVOD	Bakteriální
Do dvou hodin od přisátí	RIZIKO NÁKAZY Z INFIKOVANÉHO KLÍŠŤETE	Až zhruba po 24 hodinách po přisátí. Někdy i po delší době.
Existuje. Přeočkování je vhodné jednou za 5 let. Vakcína je vhodná i pro děti.	OČKOVÁNÍ	Neexistuje
Cílená léčba neexistuje, léčí se pouze symptomy.	LÉČBA	Lékař předepíše antibiotika.
Nervovou soustavu	NAPADÁ	Kůži, klouby a nervovou soustavu
3–5 dní po přenosu	PRVNÍ PŘÍZNAKY NASTÁVAJÍ	2–4 týdny po přenosu
Horečky, únava a bolesti hlavy. Příznaky většinou poměrně rychle odezní.	PRVNÍMI PŘÍZNAKY JSOU	Kožní projevy, charakteristická rudá skvrna s centrálním vyblednutím. Dále příznaky podobné chřipce. Ani jedno se ale nemusí projevit.
Obvykle 1–20 dnů po odeznění prvních příznaků	DRUHÁ VLNA NASTÁVÁ	1–4 měsíce po prvních příznacích
Světloplachost a silné bolesti hlavy. Přidávají se příznaky připomínající chřipku, ale ve výrazně větší intenzitě než v první fázi.	PŘÍZNAKY DRUHÉ VLNY JSOU	Bolesti hlavy, poruchy soustředění, ztráta vědomí, záněty nervů, kloubů a srdečního svalu.
Samostatná chronická fáze nenastává. Trvalé následky může zanechat už druhá vlna.	CHRONICKÁ FÁZE NASTÁVÁ	Po měsících až letech po skončení druhé vlny. Nemusí nastat vůbec.
Permanentní bolesti hlavy, poruchy spánku, deprese. V některých případech poruchy rovnováhy, obrym různého stupně a chronický třes.	CHRONICKÉ PŘÍZNAKY	Modročervené zbarvení kůže na končetinách, bolest a otékání kloubů, poškození nervového systému. V extrémním případě hrozí ochrnutí.
Ve velmi ojedinělých případech může končit úmrtím pacienta.	JE NEMOC FATÁLNÍ	Smrtelná není.

Zdroj: synlab czech